

MEDOTİLİN

İ.M./İ.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 1000 mg/4 ml

- **Ürün Bilgisi:**

Terapötik Endikasyonları ;Beyin sapının ağırlıklı olarak etkilendiği, travmatik beyin hasarlarının akut dönemindeki bilinç bozukluklarında, İskemik inmenin akut ve iyileşme dönemleri ile hemorajik inmenin iyileşme dönemlerinde, Beynin dejeneratif ve vasküler hastalıklarındaki kognitif bozukluklarda,Multiinfarkt demanslarda esas tedavilere yardımcı tedavi olarak kullanılabilir.

- **Pozoloji:**

MEDOTİLİN, intramüsküler ve intravenöz olarak kullanılır.**Akut koşullarda;** İntramüsküler olarak günlük doz miktarı 1g (1 ampul). İntravenöz uygulamada, 1 ampul içerdiği (4 ml) 50 ml serum fizyolojik içinde infüzyon hızı dakikada 60-80 damla olacak şekildedir. Ortalama tedavi süresi 10 gündür ancak ihtiyaç duyulduğunda iyileşme görülene kadar tedaviye devam edilebilir.

- **Ana bileşenleri:**

Kolin alfoskerat 1000 mg